

## Klinický protokol indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 9)

MZSR vydáva z dôvodu priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike ku dňu 19.5.2020 nasledovné úpravy k indikáciám pre odber vzoriek výterom z orofaryngu a nazofaryngu za účelom PCR diagnostiky suspektných alebo pozitívnych osôb v súvislosti s COVID-19:

### Pacienti indikovaní na vyšetrenie na základe klinických príznakov

- Pacient (dospelý alebo dieťa) s akútnou infekciou dýchacích ciest - náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: **kašeľ, telesná teplota nad 38 °C** po dobu 3 a viac dní bez inej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz, resp. ak nie je známa epidemiologická anamnéza napr. anamnéza cestovania alebo pobytu v krajine/oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite, počas 14 dní pred objavením sa symptómov, alebo pri skupinách, ktoré majú výnimku prechodu cez štátne hranice (napr. nákladná, lodná doprava), **dýchavičnosť**
- Pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred objavením sa symptómov **v úzkom kontakte s potvrdeným COVID-19**
- Klienti v zariadeniach sociálnych služieb alebo MRK s respiračnou infekciou (na indikáciu **všeobecného lekára, infektológa, epidemiológa, alebo hygienika**)
- Tehotné pacientky, ktoré prišli na pôrod akútne a majú respiračnú infekciu alebo kontakt s potvrdeným **(v posledných 14 dňoch)** alebo s pravdepodobným prípadom COVID-19 **(v procese vyšetrenia PCR)**
- Pacienti pred akútnym operačným/ **intervenčným** výkonom v celkovej anestézii s respiračnou infekciou a/alebo známym úzkym kontaktom alebo z karantény pre COVID-19
- Pacienti na OAIM a JIS pri náhlom vývoji respiračnej insuficiencie s nejasnou etiológiou
- Pacient vyžadujúci hospitalizáciu (SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz

### Pacienti indikovaní na vyšetrenie na základe epidemiologických a iných kritérií

- Úzke kontakty s potvrdenou infekciou COVID-19 (odobrať výter sa odporúča v 5. deň a **v prípade negativity zväziť obder aj v 14. deň**)
- Pacient po prekonaní infekcie COVID-19 (nutnosť dvoch negatívnych PCR vyšetrení)
- Je možné zväziť vyšetrenie exponovaných zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov pracujúcich v karanténnych centrách (napr. MVSР pri repatriácii, s ľuďmi bez domova), **MO SR, OZ SR pri práci s rizikovými skupinami (pre túto skupinu je možné stanoviť protilátky proti SARS-CoV-2 a do zátvorky (imunoanalýza, RDT test)**
- Psychiatrickí pacienti, **u ktorých nie je možné odobrať validnú objektívnu anamnézu alebo s nízkou úrovňou dodržiavania epidemiologických štandardov**
- Klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb a CDR, denných stacionároch alebo z MRK pri **reaktívnom RDT na COVID-19**
- Traumatické stavy so zmenou vedomia a neurčité stavy na základe rozhodnutia lekára
- Test pred odberom **orgánu od darcu za účelom transplantácie**
- Klienti po absolvovaní 14-dňovej karantény pred umiestnením do ZSS alebo CDR
- Pacienti pred prepustením z nemocnice, ktorí boli hospitalizovaní pre respiračnú infekciu, febrilitu alebo z epidemiologických dôvodov z rozhodnutia lekára metódou PCR alebo pred umiestnením do pobytového zariadenia sociálnych služieb a do CDR metódou RDT